



Imágenes en urología

Reflujo uretro-deferencial en paciente intervenido de válvulas uretrales posteriores

Urethro-ejaculatory duct reflux after fulguration of posterior urethral valves



Figura 1 – CUMS. Fase de llenado. Reflujo uretro-deferencial hasta epidídimo.



Figura 2 – CUMS. Fase miccional. Residuo en uretra prostática que se halla dilatada.

M. Álvarez-Múgica^{a*}, E. Miguélez^a, F. Valle^a, M. Viejo^a, C. Espina^a, V. Bulnes Vázquez^b y Á. Martín^a

^aServicio de Urología, Hospital Valle del Nalón, Riaño, Asturias, España

^bServicio de Radiodiagnóstico, Hospital Álvarez-Buylla, Mieres, Asturias, España

*Autor para correspondencia

Correo electrónico: malvarezmug@gmail.com (M. Álvarez Múgica)

Fístula enterovesical después de un tratamiento con radioterapia por cáncer ginecológico

Enterovesical fistula after radiotherapy for gynecological carcinoma




Figura 1 – Tomografía computarizada abdominal que muestra hidronefrosis bilateral y vejiga redondeada de pequeño tamaño, en mujer de 87 años, que presenta fecaluria y deterioro de la función renal, tras un cambio de sonda vesical. Antecedentes de adenocarcinoma de endometrio, tratado con cirugía y radioterapia adyuvante; rectitis, enteritis y cistitis postactínica.



Figura 2 – Tomografía computarizada abdominal donde se aprecia sonda vesical que sobrepasa los límites de la vejiga, con el globo del catéter craneal a esta y punta alojada en ciego. En laparotomía de urgencia se confirmó fístula vésico-cecal de origen iatrogénico.

P.A. López González*, G. Server Pastor, G. Doñate Iñiguez, J.C. Ruiz Morcillo, C. Moreno Alarcón y M. Pérez Albacete

Servicio de Urología, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España

*Autor para correspondencia

Correo electrónico: peterangel@ono.com (P.A. López González)