

La imagen del mes

Hernia retroanastomótica tras cirugía bariátrica**Retro-anastomotic hernia after bariatric surgery**

David Iborra Cebriá*, David Álvarez Martínez, Carlos Redondo Cano y
Jose Vicente García Díez

Unidad de Coloproctología, Servicio de Cirugía General, Hospital de la Ribera, Alzira, Valencia, España



Figura 1



Figura 2

Varón de 60 años que acudió a urgencias por dolor epigástrico, intenso, de inicio súbito y de horas de evolución. Antecedentes personales: cirugía bariátrica 3 años antes (Scopinaro). Exploración física: vientre en tabla. Analítica con 14.000 leucocitos, un 90% neutrófilos. Radiografía de abdomen: dilatación de asas de delgado en hemiabdomen superior. Tomografía computarizada abdominal urgente: rotación completa de asas de delgado sobre eje mesentérico, «signo del remolino» (figs. 1 y 2).

Se practicó laparotomía urgente, y se evidenció herniación completa de asas de delgado a través de meso de pie de asa. Se desvolvularon las asas y se suturó el meso.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: adi@comv.es (D. Iborra Cebriá).

0009-739X/\$ – see front matter © 2010 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

doi:10.1016/j.ciresp.2010.05.014